

L'art d'éliminer les pathogènes

Désinfectant bactéricide, virucide et levuricide à fort pouvoir oxydatif pour l'hygiène en élevage, Virkon™ S est la référence mondiale en désinfection de surface. Efficacité prouvée sur plus de 350 souches, Virkon™ S agit même à basse température. Sa formulation sous forme de poudre soluble à base d'Oxone le rend très sûr à utiliser. Biodégradable à 90%, il est utilisable en agriculture biologique.

Caractéristiques :

- Désinfectant de surface au large spectre bactéricide, levuricide et virucide
- Ultra oxydatif grâce à sa puissante matière active biocide : l'Oxone
- Action combinée d'acides organiques et minéraux qui permet d'abaisser le pH et de potentialiser l'action de l'Oxone
- Activité tensioactive et détergente pour une meilleure pénétration des biofilms, ce qui favorise le contact intime entre la solution biocide et les pathogènes à détruire
- Application en trempage, pulvérisation et nébulisation
- Idéal pour les bâtiments d'élevage, les surfaces, les équipements et les circuits d'eau
- Adapté pour de multiples usages : usage en TP2, TP3, TP4
- Expertise mondiale apportant les garanties d'efficacité et de sûreté

Avantages :

- Désinfection des surfaces (TP3)
- Désinfection par voie aérienne en présence des animaux (TP3)
- Désinfection de la peau saine de l'animal (TP3)
- Désinfection des canalisations (TP4)
- Action stable, même à basse température, en eau dure et en conditions de saletés élevées
- Efficace sur surface poreuse, en eau dure et à basse température
- Respect de l'environnement : biodégradable à 90 % et non classé H400, H410 et H411
- Utilisable en agriculture Biologique (en application du RCE n° 834/2007)
- Dispose d'un indicateur coloré d'efficacité désinfectante

Bénéfices :

- Désinfectant de premier choix dans la lutte contre les maladies contagieuses et les pathogènes représentatifs des filières d'élevage
- Mise en oeuvre simple : gain de temps
- Facile d'utilisation grâce au format poudre
- Ultra polyvalent pour de multiples applications
- Garantie d'efficacité grâce à l'indicateur coloré
- Sécurité pour l'utilisateur

Substance active biocide :

bis (peroxomonosulfate) bis (sulfate) de pentapotassium, CAS n°70693-62-8

Efficacité :

	Surfaces non poreuses TP3 / 10 °C		Surfaces poreuses TP3 / 20 °C
	30 mn	10 mn	
Bactéricide	0,5 % EN 14349	1% EN 14349	1 % EN 16437

	Activité sur ECBO	
	30 mn	10 mn
Virucide	0,5 % EN 14675	1 % EN 14675

Propriétés physico-chimiques :

- Etat physique : poudre rosée soluble dans l'eau
- Odeur : légère odeur de citron
- Densité à 20 °C : 1,01
- pH à 1% : 2,4 - 2,7
- Durée de conservation : 3 ans dans les conditions normales de stockage

» Applications :

Pour une désinfection bactéricide et virucide des surfaces, diluer Virkon™ S à 0,5%, soit 5 g par litre d'eau ou 500 g pour 100 L d'eau. Pour une désinfection levuricide, diluer Virkon™ S à 1,5%, soit 75 g de poudre dans 5 L d'eau. Attendre la dissolution complète du produit. Nettoyer les surfaces avant de les désinfecter. Appliquer la solution soit par trempage ou par pulvérisation à raison de 300 mL/m². Utiliser un matériel de pulvérisation approprié. Laisser agir la solution pendant 30 minutes pour une activité bactéricide (ou 60 minutes sur surface poreuse), 30 minutes pour une activité virucide et 60 minutes pour une activité levuricide. Rincer l'équipement après traitement.

Usage	Dilution		Mode d'application
	B / V	B / V / L	
Désinfection des surfaces (TP3)	0,5%	1,5%	Appliquer la solution en pulvérisation à raison de 200 à 300 mL/m ² sur toutes les surfaces du bâtiment.
Désinfection des matériels (TP3 - TP4)	0,5%	1,5%	Appliquer à raison de 200 à 300 mL/m ² sur les équipements agricoles, matériels d'alimentation et véhicules. Rincer avec de l'eau potable.
Désinfection par voie aérienne en présence des animaux (TP3)	0,5%		Appliquer sous forme de fine brume dans l'espace vide au-dessus des animaux, jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Utiliser quotidiennement jusqu'à 6 jours, à raison de 40 mL par m ² de surface au sol.
Désinfection de la peau (TP3)	Diluer Virkon™ S à 0,75%		Appliquer la solution à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon propre, appliquer généreusement sur la peau saine en évitant le contact avec les yeux, les oreilles et les voies respiratoires. Après 5 minutes de contact, bien rincer à l'eau potable.
Désinfection par nébulisation (TP3)	Diluer Virkon™ S à 1%		Prévoir 1 L de solution pour traiter un volume de 10m ² au sol (ou 40 mL par m ³ d'air) avec un matériel approprié. Bien rincer le matériel à l'eau après désinfection.
Désinfection des circuits d'eau (TP4)	Diluer Virkon™ S à 1%, soit 1 kg de Virkon™ S pour 100 L d'eau		Désinfection des bacs et systèmes de distribution d'eau. Laisser agir pendant 4 heures. Rincer obligatoirement avec de l'eau potable après désinfection.

Pour une utilisation précise et économique de Virkon™ S, utiliser les matériels de dosage fournis selon les formats :

- La cuillère doseuse de 10 g (présente dans la boîte de 1 kg).
- Le verre doseur gradué de 25 g à 200 g (présent dans les boîtes de 2,5 kg, 5 kg et le seau de 10 kg).
- Le couvercle jaune allant jusqu'à 700 g maximum (présent sur les boîtes de 2,5 kg et 5 kg), pour peser les quantités nécessaires à vos besoins.



» Présentations :

Boîte de 25 sachets de 50 g
 Boîte de 1 kg
 Boîte de 2,5 kg
 Boîte de 5 kg
 Seau de 10 kg
 Virkon™ S Tablets : 50 x 5 g (sous forme de tablettes)

» Précautions d'emploi :

Désinfectant de surface réservé aux vétérinaires et aux professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette, la fiche de sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation. Conserver dans un endroit sec et frais en ayant bien refermé le couvercle. Toujours bien refermer le couvercle après utilisation si le produit doit être stocké pour une certaine période. Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

