Contrôlé par ECOCERT INTRANTS

Contrôle ECOCERT
SA F – 32600

Meri Airnapur®

Virucide selon EN 14476 (*)

1117728-01

DÉSINFECTANT PAR VOIE AERIENNE
Bactéricide, Fongicide, Virucide

Efficacité

Selon la norme NFT72-281, Temps de contact : 1h, Température :18 à 20°C
3 g/l d'albumine bovine

LEVURICIDE 2.5 ml/m³
Candida albicans

BACTÉRICIDE 5 ml/m³
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae

VIRUCIDE 5 ml/m³
Enterovirus type 1, virus enveloppés (vaccine, Coronavirus, etc.)

FONGICIDE 10 ml/m³
Aspergillus brasiliensis

Selon la norme EN 14476
20°C, conditions de propreté, 15 mn

(*) VIRUCIDE *sur Virus enveloppés (virus de la Vaccine, Coronavirus, etc.)*

Désinfection de tout type de local fermé
application par nébulisation/thermonébulisation

Formule concentrée
à action rapide et totale

Conçu pour une meilleure maîtrise de l'empreinte environnementale

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

Utilisable en Agriculture Biologique, en industries alimentaires, transformation, et bâtiment d'élevage
RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL

LABO MERIEL

Meri Airnapur®

DÉSINFECTANT PAR VOIE AERIENNE

Composition - concentré liquide soluble contenant en % massique :Acide Lactique (CAS 579-33-4) : 5.0%, Peroxyde d'Hydrogène (CAS 7722-84-1) : 7.5%.

USAGES : TP2 : désinfection des salles de réunions, halls de réception, couloirs, cantines, entrepôts de stockage, serres et abris, etc. **TP3 :** désinfection des locaux vides et des matériels d'élevage. **TP4 :** désinfection de surface en contact avec les denrées alimentaires.

Doses d'emploi : appliquer 5 ml de produit pur par m³ à traiter pour une action bactéricide et virucide totale, 10 ml de produit pur par m³ pour une action fongicide.

Désinfection par Nébulisation à froid : Préparer une solution d'Airnapur® dans l'eau entre 10% et 50% (ex : 1 L d'Airnapur® dans 4 L d'eau). Remplir le réservoir de l'appareil avec la solution. Nébuliser la solution dans le local à désinfecter totalement fermé et vide de toute présence humaine ou animale. Laisser agir 1h minimum à 20°C puis aérer pendant 30 à 60 minutes avant d'autoriser l'accès au local.

Désinfection grands volumes par Thermo-nébulisation : Préparer une solution d'Airnapur® dans l'eau entre 50 et 80% (ex : 7 L d'Airnapur® dans 5 L d'eau). Remplir le réservoir de l'appareil avec la solution. Thermonébuliser la solution dans le local à désinfecter totalement fermé et vide de toute présence humaine ou animale. Laisser agir 1h minimum à 20°C puis aérer pendant 30 à 60 minutes avant d'autoriser l'accès au local.

Exemple : pour un local de 100 m³ (40 m² au sol environ), prévoir 500 ml de produit pur pour une action virucide
Mélanger 500 ml de produit dans 1500 ml d'eau pour obtenir 2 L de solution à nébuliser.

N°de lot/ date de péremption : voir bidon

PRECAUTIONS D'EMPLOI : utiliser les biocides avec précaution.
Lire l'étiquette ou la FDS avant utilisation

Mentions de Danger : H315 Provoque une irritation cutanée. **H318** Provoque de graves lésions des yeux. **Conseils de prudence Prévention :** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **Intervention :** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer/ Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin - **Elimination :** Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations en vigueur.

Après application sur des surfaces et matériels en contact avec des denrées alimentaires, le rinçage des surfaces à l'eau potable est obligatoire. Stocker dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la chaleur, du gel et de la lumière. Laisser le bidon fermé avec le bouchon dégazeur d'origine. NE PAS EMPECHER LE BON FONCTIONNEMENT DU BOUCHON DEGAZEUR. Nettoyer les matériels d'application à l'eau. Produit acide de pH 2.3 ne pas mélanger aux bases. Ne pas utiliser le produit pur. Faire un test préalable sur une petite surface avant application. Pour éviter la formation de mousse, mélanger doucement le produit à l'eau.

1117729-01

DANGER



Identificateurs du produit :
008-003-00-9 PEROXYDE D'HYDROGENE, SOLUTION ;
EC 201-196-2 ACIDE LACTIQUE

Tél. en casd'urgence :
INRS 01 45 42 59 59

Contenu net : **5** litres

Conçuet fabriqué en France par :
Laboratoire Mériel,
12 rue de Malacussy
42100 SAINT ETIENNE

Un produit HUVEPHARMA S.A.
ZI d'Etriché, 34 rue Jean Monnet,
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU;
Tel : 02 41 92 11 11; info.france@huvepharma.com

Date	July 2020	Product	Airnapur - 5 L
Label identifier number		Country	France
Paper weight, g/m²		Text size	8 pt; 7 pt; 6 pt
Dimensions	140 x 130 mm	Font	Century Gothic
Type of Printing	Label	Unroll - scheme	
Type of Packing	Label	Logo	
Colors	C M Y K	Author	Novis Design