

INSECTICIDES POUR BATIMENTS D'ELEVAGE 2010 Novartis Santé Animale Point technique

NEPOREX 2SG:

Un larvicide pour traiter les problèmes de mouches, moucheron et vers à queue à la source

Principe actif régulateur de croissance

Neporex® 2SG est un régulateur de croissance des insectes (*IGR : Insect Growth Regulator*) à base de cyromazine. Cette molécule empêche le développement des larves de mouches et de moucheron. La cyromazine bloque la synthèse de la cuticule épidermique de chitine, entraînant la mort des larves en croissance.

Méthode d'application et dosage

Neporex® 2SG se présente sous forme de granulés solubles dans l'eau contenant 2% de principe actif (*cyromazine*). Il doit être appliqué selon différents modes opératoires : **dissout dans de l'eau et appliqué au pulvérisateur ou à l'arrosoir, ou à la volée.**

QUELLE QUANTITÉ QUELLE SUPERFICIE

Surface au sol à traiter	40 m ²	100 m ²	200 m ²	400 m ²	600 m ²	800 m ²
Qté de NEPOREX® 2SG nécessaire	1 kg	2,5 kg	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg

APPLICATION et DOSAGES

NEPOREX® 2SG	Application	Dosage	Surface au sol à traiter
Sur croute sèche	arrosage	250 g / 10 l d'eau	10 m ²
Sur croute humide	pulvérisation	250 g / 1 à 4 l d'eau	10 m ²
Sur lisier liquide	à la volée	250 g	10 m ²

Lors d'une application à la volée, il est conseillé d'arroser la surface traitée pour permettre la dissolution des granulés et obtenir une efficacité optimale.

LARVICIDE : traitement préventif indispensable



- **Neporex® 2SG** traite la source du problème : les larves de mouches, les larves de moucheron, et les vers à queue.
- Action préventive et curative indispensable pour une stratégie efficace en élevage.
- Facile à utiliser.
- Rémanent 6 semaines, dans les conditions normales d'utilisation.
- Applicable en présence des animaux, en évitant le contact direct avec les animaux pendant l'application.

Disponible en format 5 kg et 20 kg

Insecticide pour bâtiment d'élevage pour usage professionnel

Composition : granulés solubles à 2 % de cyromazine. **Autorisation de vente :** A.V. n°8400591 pour la désinsectisation des logements d'animaux domestiques, à la dose de 25 g/m². **Mode d'emploi :** Utiliser NEPOREX 2SG dès l'apparition des premières mouches. Quantité pour 10 m² de surface : Sur fumier sec, à l'arrosoir : 250 g dissous dans 10 litres d'eau. Sur fumier humide, au pulvérisateur : 250 g dissous dans 1 à 4 litres d'eau. Sur fumier humide ou sur lisier : épandre 250 g de granulés secs à la volée. La dose recommandée inhibe le développement des larves présentes sur une épaisseur de 10 cm dans la couche supérieure de la litière. Rechercher et traiter tous les endroits où se développent les larves de mouches et de moucheron. Ne pas utiliser sur parois ou plafonds. **Précautions d'emploi :** En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Conserver uniquement dans l'emballage d'origine, hors de portée des enfants, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux des animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'application. Ne pas déverser les produits résiduels dans un égout ou dans un endroit d'où ils pourraient être entraînés vers la propriété d'un tiers. NEPOREX® 2SG peut être appliqué en présence des animaux en évitant le contact direct avec les animaux pendant l'application et en ne pulvérisant pas les abreuvoirs, mangeoires et autres parties destinées à recevoir les aliments. **Présentations :** Sac de 5 kg (regroupement par cartons de 4) A.C.L. : 613768.0. Sac de 20 kg A.C.L. : 765748.2. ® Marque enregistrée Novartis AG Bâle, Suisse. **Pour toute information :** Novartis Santé Animale S.A.S, 14 boulevard Richelieu, F-92500 Rueil-Malmaison, tél. 01 55 47 87 47 – www.ah.novartis.com.
Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.