Meri Airnapur®

VIRUCIDE
selon
EN14476+A2*

DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE, FONGICIDE, VIRUCIDE
POUR APPLICATION PAR VOIE AÉRIENNE



Contrôle Ecocert
SA F-32600

Contrôlé par ECOCERT INTRANTS

EFFICACITÉ

selon la norme EN 17272,
temps de contact : 1 heure,
température : 18 à 20°C
3 g/L d'albumine bovine

Levuricide 4 ml/m³
Candida albicans
(dont *Brettanomyces abstinens*)

Bactéricide 5 ml/m³
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Proteus vulgaris

Virucide 5 ml/m³
Enterovirus type 1, Adenovirus, Rotavirus, Norovirus, virus enveloppés
(Vaccine, Coronavirus, etc.)

Fongicide 10 ml/m³
Aspergillus brasiliensis,

selon la norme EN 14476+A2
20°C, conditions de propreté,
15 minutes

(*) Virucide
sur virus enveloppés
(virus de la Vaccine, Coronavirus, etc.)

DÉSINFECTION DE TOUT TYPE DE LOCAL FERMÉ

application par nébulisation / thermonébulisation

Formule concentrée
à action rapide et totale

Conçu pour une meilleure maîtrise
de l'empreinte environnementale

Utilisable en **Agriculture Biologique**
en application du règlement (CE) n° 834/2007
pour la désinfection des surfaces en contact avec
les denrées alimentaires

USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

CRÉÉ & FABRIQUÉ EN FRANCE

HUVEPHARMA®

Meri Airnapur®

PUISSANT BIOCIDE POUR LA DÉSINFECTION
PAR VOIE AÉRIENNE DES LOCAUX FERMÉS

MODE D'EMPLOI ET DOSAGES :

Temps de contact : 15 minutes selon EN 14476+A2, 1 heure selon EN 17272

Dose d'emploi : 5 ml/m³ de produit pur au final pour une action bactéricide, levuricide et virucide ; 10 ml/m³ de produit pur au final pour une action fongicide

Préparation du produit et de sa solution : la préparation dépend du volume à traiter et de la capacité du réservoir de l'appareil de diffusion – voir tableau

Application par nébulisation :

- Calculer la quantité de produit nécessaire en fonction de la dose d'emploi et du volume à traiter (exemple : pour 100 m³ à 5 ml/m³, le besoin est de 0,5 L).
- Verser Airnapur® dans le réservoir du nébuliseur puis compléter avec de l'eau sans dépasser 9 volumes d'eau pour 1 volume d'Airnapur®. (exemple pour 0,5 L d'Airnapur® ne pas rajouter plus de 4,5 L d'eau). Verser l'eau en remuant doucement pour éviter la formation de mousse.
- Nébuliser la totalité de la solution dans le local fermé et vide de toute présence. Laisser agir pendant le temps de contact adapté à l'effet recherché à 20°C puis aérer entre 10 et 60 minutes selon le taux de renouvellement d'air avant d'autoriser l'accès au local.

Thermonébulisation :

- Calculer la quantité de produit nécessaire en fonction de la dose d'emploi et du volume à traiter (exemple : pour 600 m³ à 5 ml/m³, le besoin est de 3 L).
- Verser Airnapur® dans le réservoir du thermo fogger puis compléter avec sans dépasser 9 volumes d'eau pour 1 volume d'Airnapur® (exemple pour 3 L d'Airnapur® ne pas rajouter plus de 27 L d'eau). Verser l'eau en remuant doucement pour éviter la formation de mousse.
- Actionner le thermo fogger et laisser le diffuser la totalité de la solution dans le local fermé et vide de toute présence. Laisser agir pendant le temps de contact adapté à l'effet recherché à 20°C puis aérer entre 10 et 60 minutes selon le taux de renouvellement d'air avant d'autoriser l'accès au local.

Exemples de préparation pour un traitement bactéricide, levuricide et virucide : 5 ml/m³ de produit pur au final

Surface au sol du local	Volume à traiter (plafond à 2,5m)	Appareil de diffusion conseillé	Dose	Quantité de produit pur	Quantité d'eau	Solution totale dans le réservoir	Soit une dilution totale à
20 m²	50 m³	Nébuliseur	5 ml/m³	0,25 L	1,75 L	2 L	13 %
100 m²	250 m³	Nébuliseur	5 ml/m³	1,25 L	2,75 L	4 L	31 %
200 m²	500 m³	Thermo fogger	5 ml/m³	2,50 L	4,5 L	7 L	36 %
400 m²	1 000 m³	Thermo fogger	5 ml/m³	5 L	3 L	8 L	63 %

Caractéristiques :
Densité : 1,04
pH du produit pur : 2,5
pH en dilution à 1% : 3,8

Composition : Liquide soluble contenant en % massique :
Peroxyde d'hydrogène : 7,5%
Acide lactique : 5,0%
Biocide TP2, TP3 et TP4.

Précautions d'emploi : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. Airnapur® est conforme à l'arrêté du 8/09/99 relatif à la désinfection des surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires. Airnapur® est un produit acide. Il est conseillé de faire un test sur la surface à traiter avant toute utilisation. Après traitement des surfaces en contact avec les denrées alimentaires, le rinçage à l'eau potable est obligatoire. Lors du mélange du produit dans l'eau et le remplissage du réservoir de l'appareil d'application, procéder doucement afin de limiter la formation de mousse.

Présentations :
Bidon de 5 L et 20 L

Conservation : Stable 18 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la chaleur. Lors du stockage, utiliser uniquement et impérativement le bouchon dégazeur en bon état de fonctionnement. NE PAS FERMER AVEC UN AUTRE BOUCHON.

CRÉÉ & FABRIQUÉ EN FRANCE

Meri Airnapur®

PUISSANT BIOCIDE POUR LA DÉSINFECTION PAR VOIE AÉRIENNE DES LOCAUX FERMÉS

Normes d'efficacité par voie aérienne :

Norme	Spectre	Souches testées	Conditions	Substances interférentes	Température	Temps de contact	Résultats
EN 17272 (NFT72-281)	Bactéricide	Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris	Saleté	3 g/L albumine bovine	20°C	1 heure	4,9 ml/m³
EN 17272 (NFT72-281)	Levuricide	Candida albicans	Saleté	3 g/L albumine bovine	20°C	1 heure	3,9 ml/m³
EN 17272 (NFT72-281)	Fongicide	Aspergillus brasiliensis	Saleté	3 g/L albumine bovine	20°C	1 heure	9,7 ml/m³
EN 17272 (NFT72-281)	Virucide	Enterovirus bovin type 1 (ECBO, Picornavirus)	Saleté	3 g/L albumine bovine	20°C	1 heure	5,1 ml/m³
EN13697	Virus spécifiques	Adenovirus, Norovirus murin	Saleté	3 g/L albumine bovine	20°C	1 heure	-
Test terrain Phase 3 - Nébulisation (volume <300m³)	Bactéricide	Enterococcus hirae (souche limitante)	Saleté	3 g/L albumine bovine	23°C	1 heure	5 ml/m³
Test terrain Phase 3 - Nébulisation (volume <300m³)	Fongicide	Aspergillus brasiliensis	Saleté	3 g/L albumine bovine	28°C	1 heure	10 ml/m³
Test terrain Phase 3 - Thermo-nébulisation (volume de 300m³ à 1000m³)	Bactéricide	Enterococcus hirae (souche limitante)	Saleté	3 g/L albumine bovine	16°C	3 heures	5 ml/m³
Test terrain Phase 3 - Thermo-nébulisation (volume de 300m³ à 1000m³)	Fongicide	Aspergillus brasiliensis	Saleté	3 g/L albumine bovine	13°C	3 heures	10 ml/m³

Autres normes de validation	Spectre	Souches cibles	Conditions	Substances interférentes	Température	Temps de contact	Résultats
EN 1276	Bactéricide	Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa	Propreté	3 g/L albumine bovine	20°C	5 minutes	Actif
EN 1650	Levuricide	Candida albicans	Propreté	3 g/L albumine bovine	20°C	15 minutes	Actif
EN 1650	Fongicide	Aspergillus brasiliensis	Propreté	3 g/L albumine bovine	20°C	15 minutes	Actif
EN 14476+A2	Virus enveloppés	Virus de la vaccine	Propreté	3 g/L albumine bovine	20°C	15 minutes	Actif

FT MERI AIRNAPUR 03.2022

HUVEPHARMA®
Huvepharma SA - 34 rue Jean Monnet - Z.I. d'Etriché - Segré - 49500 Segré-en-Anjou Bleu - France
Tél : +33 (0)2 41 92 11 11 - Email : info.france@huvepharma.com